andalus

FUNDACION BIOS
para la conservación de la naturaleza

Avance de los resultados del Buitre Negro en 2012

SIERRA PELADA TAMBIÉN NECESITA UN RESCATE

Proyecto Buitre Negro

Andalus y Fundación Bios

En febrero de 2012, con el arranque de la temporada de cría del Buitre Negro en Sierra Pelada, se confirmó el alto grado de inhibición, registrado los últimos cuatro años, de la Consejería de Medio Ambiente con relación a la conservación de esta especie protegida en su principal área en Andalucía: nidos de Buitre Negro muy vulnerables por actuaciones de temporadas anteriores continuaban sin protección; actuaciones realizadas sobre eucaliptales y pinares que no obedecían a la consecución del doble objetivo de producción económica y conservación; cientos de hectáreas quemadas en 2003 que aún no habían sido recuperadas; decenas de kilómetros de valla, derribadas ya en muchos tramos, que debían servir para proteger plantaciones de encinas y alcornoques que seguían sin llegar después de 9 años, etc.

A comienzos del mes siguiente, el día 10, se localizaron muertos un Buitre Negro y ocho buitres leonados en cierto cortafuegos localizado en plena colonia de cría. Los tres ejemplares que pudieron ser analizados en el CAD (Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre), dependiente de la Junta de Andalucía, entre ellos el Buitre Negro, dieron positivo a clorfenvinfós, un potente plaguicida. Teniendo en cuenta que en dicho centro de diagnóstico se determinó que los buitres habían muerto en fechas muy diferentes es altamente probable que la fuente de contaminación fuera una carroña de equino, no analizada, encontrada cerca de los cadáveres, a muchos kilómetros de la población humana y de la explotación de equinos más cercanas. Corolario de lo anterior es que el número de buitres muertos en este mismo episodio puede haber sido mayor.

Los datos del censo recogidos hasta mediados de julio concluyen que, si la gestión de Sierra Pelada registrada años anteriores hizo que desapareciera

completamente el Buitre Negro de los territorios de cría que ocupaba en los términos municipales de Santa Bárbara de Casa y Cabezas Rubias, además de en los montes propiedad de la Junta de Andalucía denominados "Prado Arriero", "El Vínculo", "Santa Clara" y "Mahoma", la temporada de cría de 2012 confirma la práctica liquidación de las nidificaciones de esta especie en los montes, también propiedad de la Junta de Andalucía, "Los Ciries" y "Peramora". Para poder valorar el alcance espacial de todos estos montes se ha insertado un mapa donde aparece resaltado el ámbito del Paraje Natural de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (de 12.000 hectáreas). Se da la paradoja que "Los Ciries" fue adquirido por la Junta de Andalucía, mediante permuta, para conservar el Buitre Negro. En "Los Ciries" solo dos parejas han iniciado la cría este 2012 y mediada esta temporada ambas habían perdido la puesta. Una de ellas tiene su nido junto a un camino forestal que la Consejería de Medio Ambiente no ha querido clausurar nunca a pesar de que esta medida no perjudicaría a ninguna persona. Por si fuera poco en este monte se han cortado eucaliptos estos últimos años, y no solo no se han sustituido por parte de esa consejería, como tenía previsto y acordado con Andalus y Fundación Bios, estos cultivos forestales por encinas y alcornoques, sino que durante las labores forestales de la pretemporada de cría de 2012 **ha sido derribado uno de los nidos** (ver fotografía). La rotura de la rama de soporte de este nido ha supuesto que el árbol en cuestión, un alcornoque, haya quedado imposibilitado para albergar otro nido. Este dato cobra mayor interés si se tiene en cuenta que hay muy pocos árboles que pueden acoger nido en este extenso monte. Otro de los nidos del mismo monte, usado ininterrumpidamente por los buitres los últimos años, lo hemos encontrado, en idéntica época, sobre el suelo. En "Los Ciries", el barranco de Don Pascual, que llegó a tener 10 nidos del Buitre Negro, no ha registrado ninguna nidificación de esta especie en 2012. Por su parte, en "Peramora" solo hay dos parejas nidificantes este 2012 y para ello una con pérdida de su puesta tardía, ocurrida entre el 22 de abril y el 15 de mayo, cuando las puestas ocurren habitualmente en febrero-marzo. Esta pareja tardía tiene su nido sobre un alcornoque ubicado en una zona que ha sido totalmente desprovista de vegetación.

Y siguiendo con el manía de desproveer de vegetación a los nidos del Buitre Negro, la misma consejería ha habilitado en la pretemporada de cría de 2012 una serie de áreas cortafuegos que han desprotegido a varios de ellos (ver fotografías). Claro que salvaguardar los montes de los fuegos es una competencia y una obligación de esta consejería. Pero la eficacia de estas áreas cortafuegos no se vería mermara en modo alguno si en los pocos metros donde hay nidos se tuviera en cuenta su existencia y la no menor obligación que tiene la misma consejería de protegerlos.


PEÑAS 1, LAS
PEÑAS 1, LAS
PEÑAS Y CORTECILLAS 1
PEÑAS 2, LAS
SANTA CLARA
LOTE 10 DEL PRADO ARRIBERO
PEÑA SIERPES 3
BARRANQUITO LLANO
PERAMORA
CALDERA ALTA, LA
EL VINCULO
RASICHE
MAHOMA
PEÑA SIERPES 2
PRADO ARRIBERO
ZAHURDITAS
PEÑA SIERPES 1
LOS CIRICS
BAJENA TAFISA
BAJENA 6
MELONES, LOS
BAJENA 5, LA
PUERTO VENTA Y BAJENAS, JUANA BLANCA
BAJENA 4
BAJENA 7
EL MARQUEZ
CUMBRES DE ENMEDIO 2
FRESNERA, LA
FRESNERA, LA (ZAHURDITAS 2)
FRESNERA, LA (PUERTO LA ZARZA)
RINCON DE LAS GRAJAS 1
RINCON DE LAS GRAJAS 2
FRESNERA, LA (FRESNERA 2)
FRESNERA, LA (GARRACHA 2)
MAMOLA, LA
PUERTO QUEJIGO
MONTE NUEVO
BALDIOS DE ALMONAT
SIERRA O BALDIOS DE CABEZAS RUBIAS, LA

Herida (elipse) dejada en el alcornoque al ser derrumbada la rama que soportaba el nido número 44. Obsérvese que el alcornoque está rodeado de eucaliptos apeados en este monte público. Fotos siguientes: localización de cuatro de los árboles con nido (elipses) afectados por la habilitación de distintas áreas cortafuegos.